


3) ロタウイルス ← によるものも 次により

- 乳幼児 (3ヶ月 --- 2才) の下痢の40%はコレ
7ヶ月 --- 15ヶ月 特に多い
- 日本 --- 患者 120万人/年 30万人入院 20人死
- 米国 ---  予防 している
これから世界的に 80% → 40万人と 死亡 減っていく

4) 肺炎球菌

- 2才以上 と 老人 (60才+) に スル
→ 74% カバーされる → 84% カバーされる
- この菌にやられると、薬が効かない (80% ペニシリン系に耐性)
- 肺炎の重症化 80% ↓
- 米国 --- 5年毎に トントン と してもいいのに
 日本 --- 一生に一度キリ と 変なクソな 規制 ある

5) ヒブ インフルエンザb型 (細菌性 髄膜炎)

- 60% が 2才未満の子にスル 1700人/年 後遺症 難聴 30% 5%死
- 診断も難しく、進行も早く、治療も難しい
-  効果 100% 急救の小児科の先生も大喜びスル
 5回 (2ヶ月初回、それ6ヶ月毎に3回、1年後に) スル
 DPT ワクチンと同じ日に、右手にソレ、左手にソレ 同時に できる
- 仏からの輸入にたよっているので、極端な不足で
 悲しくて、しょうがない!